

Ряды Фурье.

(Жан Батист Жозеф Фурье (1768 – 1830) – французский математик)

Тригонометрический ряд.

Определение. Тригонометрическим рядом называется ряд вида:

$$\frac{a_0}{2} + (a_1 \cos x + b_1 \sin x) + (a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x) + \dots + (a_n \cos nx + b_n \sin nx) + \dots$$

или, короче, $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$.

Действительные числа a_i, b_i называются коэффициентами тригонометрического ряда.

Если ряд представленного выше типа сходится, то его сумма представляет собой периодическую функцию с периодом 2π , т.к. функции $\sin nx$ и $\cos nx$ также периодические функции с периодом 2π .

Пусть тригонометрический ряд равномерно сходится на отрезке $[-\pi; \pi]$, а следовательно, и на любом отрезке в силу периодичности, и его сумма равна $f(x)$.

Определим коэффициенты этого ряда.

Для решения этой задачи воспользуемся следующими равенствами:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases} \quad m, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases} \quad m, n = 1, 2, \dots$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx dx = 0, \quad m = 0, 1, 2, \dots, \quad n = 1, 2, \dots$$

Справедливость этих равенств вытекает из применения к подынтегральному выражению тригонометрических формул.

Т.к. функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[-\pi; \pi]$, то существует интеграл

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx = \pi a_0$$

Такой результат получается в результате того, что $\int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx = 0$.

Получаем:
$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

Далее умножаем выражение разложения функции в ряд на $\cos nx$ и интегрируем в пределах от $-\pi$ до π .

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos^2 nx + b_n \cos nx \sin nx) dx = \pi a_n$$

Отсюда получаем:
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 1, 2, \dots$$

Аналогично умножаем выражение разложения функции в ряд на $\sin nx$ и интегрируем в пределах от $-\pi$ до π .

Получаем:
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Выражение для коэффициента a_0 является частным случаем для выражения коэффициентов a_n .

Таким образом, если функция $f(x)$ – любая периодическая функция периода 2π , непрерывная на отрезке $[-\pi; \pi]$ или имеющая на этом отрезке конечное число точек разрыва первого рода, то коэффициенты

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

существуют и называются **коэффициентами Фурье** для функции $f(x)$.

Определение. **Рядом Фурье** для функции $f(x)$ называется тригонометрический ряд, коэффициенты которого являются коэффициентами Фурье. Если ряд Фурье функции $f(x)$ сходится к ней во всех ее точках непрерывности, то говорят, что функция $f(x)$ разлагается в ряд Фурье.

Достаточные признаки разложимости в ряд Фурье.

Теорема. (Теорема Дирихле) Если функция $f(x)$ имеет период 2π и на отрезке $[-\pi; \pi]$ непрерывна или имеет конечное число точек разрыва первого рода, и отрезок $[-\pi; \pi]$ можно разбить на конечное число отрезков так, что внутри каждого из них функция $f(x)$ монотонна, то ряд Фурье для функции $f(x)$ сходится при всех значениях x , причем в точках непрерывности функции $f(x)$ его сумма равна $f(x)$, а в точках разрыва его сумма равна $\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$, т.е. среднему арифметическому предельных значений слева и справа. При этом ряд Фурье функции $f(x)$ сходится равномерно на любом отрезке, который принадлежит интервалу непрерывности функции $f(x)$.

Функция $f(x)$, для которой выполняются условия теоремы Дирихле называется **кусочно – монотонной** на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Теорема. Если функция $f(x)$ имеет период 2π , кроме того, $f(x)$ и ее производная $f'(x)$ – непрерывные функции на отрезке $[-\pi; \pi]$ или имеют конечное число точек разрыва первого рода на этом отрезке, то ряд Фурье функции $f(x)$ сходится при всех значениях x , причем в точках непрерывности его сумма равна $f(x)$, а в точках разрыва она равна


$\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$. При этом ряд Фурье функции $f(x)$ сходится равномерно на любом отрезке, который принадлежит интервалу непрерывности функции $f(x)$.

Функция, удовлетворяющая условиям этой теоремы, называется **кусочно – гладкой** на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Разложение в ряд Фурье непериодической функции.

Задача разложения непериодической функции в ряд Фурье в принципе не отличается от разложения в ряд Фурье периодической функции.

Допустим, функция $f(x)$ задана на отрезке $[a, b]$ и является на этом отрезке кусочно – монотонной. Рассмотрим произвольную периодическую кусочно – монотонную функцию $f_1(x)$ с периодом $2T \geq |b-a|$, совпадающую с функцией $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.



Таким образом, функция $f(x)$ была дополнена. Теперь функция $f_1(x)$ разлагается в ряд Фурье. Сумма этого ряда во всех точках отрезка $[a, b]$ совпадает с функцией $f(x)$, т.е. можно считать, что функция $f(x)$ разложена в ряд Фурье на отрезке $[a, b]$.

Таким образом, если функция $f(x)$ задана на отрезке, равном 2π ничем не отличается от разложения в ряд периодической функции. Если же отрезок, на котором задана функция, меньше, чем 2π , то функция продолжается на интервал $(b, a + 2\pi)$ так, что условия разложимости в ряд Фурье сохранялись.

Вообще говоря, в этом случае продолжение заданной функции на отрезок (интервал) длиной 2π может быть произведено бесконечным количеством способов, поэтому суммы получившихся рядов будут различны, но они будут совпадать с заданной функцией $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

Ряд Фурье для четных и нечетных функций.

Отметим следующие свойства четных и нечетных функций:

$$1) \int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & f(x) - \text{нечетная} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f(x) - \text{четная} \end{cases}$$

- 2) Произведение двух четных и нечетных функций является четной функцией.
- 3) Произведение четной и нечетной функций – нечетная функция.

Справедливость этих свойств может быть легко доказана исходя из определения четности и нечетности функций.

Если $f(x)$ – четная периодическая функция с периодом 2π , удовлетворяющая условиям разложимости в ряд Фурье, то можно записать:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0; \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Таким образом, для четной функции ряд Фурье записывается:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

Аналогично получаем разложение в ряд Фурье для нечетной функции:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx;$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Пример. Разложить в ряд Фурье периодическую функцию $f(x) = x^3$ с периодом $T = 2\pi$ на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Заданная функция является нечетной, следовательно, коэффициенты Фурье ищем в виде:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^3 \sin nx dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x^3; \quad dv = \sin nx dx \\ du = 3x^2 dx; \quad v = -\frac{\cos nx}{n} \end{array} \right\} = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{x^3 \cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} + \frac{3}{n} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx \right) =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} u = x^2; \quad dv = \cos nx dx \\ du = 2x dx; \quad v = \frac{\sin nx}{n} \end{array} \right\} = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi^3 \cos \pi n}{n} + \frac{3}{n} \left[\frac{x^2 \sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{2x \sin nx}{n} dx \right] \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi^3 \cos \pi n}{n} - \frac{6}{n^2} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right) = \left\{ \begin{array}{l} u = x; \quad dv = \sin nx dx \\ du = dx; \quad v = -\frac{\cos nx}{n} \end{array} \right\} =$$


$$= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi^3 \cos \pi n}{n} - \frac{6}{n^2} \left(-\frac{x \cos nx}{n} \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \frac{\cos nx}{n} dx \right) \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi^3 \cos \pi n}{n} + \frac{6\pi \cos \pi}{n^3} - \frac{6}{n^3} \left(\frac{\sin nx}{n} \Big|_0^\pi \right) \right) = -\frac{2\pi^2 \cos \pi n}{n} + \frac{12 \cos \pi n}{n^3} = (-1)^n \left(\frac{12}{n^3} - \frac{2\pi^2}{n} \right)$$

Получаем:

$$x^3 = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{12}{n^3} - \frac{2\pi^2}{n} \right) \sin nx.$$

Построим графики заданной функции и ее разложения в ряд Фурье, ограничившись первыми четырьмя членами ряда.



Ряды Фурье для функций любого периода.

Ряд Фурье для функции $f(x)$ периода $T = 2l$, непрерывной или имеющей конечное число точек разрыва первого рода на отрезке $[-l, l]$ имеет вид:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{\pi n}{l} x + b_n \sin \frac{\pi n}{l} x \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{\pi n}{l} x dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Для четной функции произвольного периода разложение в ряд Фурье имеет вид:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{\pi n}{l} x;$$

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{\pi n}{l} x dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Для нечетной функции:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi n}{l} x;$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{\pi n}{l} x dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Ряд Фурье по ортогональной системе функций.

Определение. Функции $\varphi(x)$ и $\psi(x)$, определенные на отрезке $[a, b]$, называются **ортогональными** на этом отрезке, если

$$\int_a^b \varphi(x)\psi(x) dx = 0$$

Определение. Последовательность функций $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$, непрерывных на отрезке $[a, b]$, называется **ортогональной системой функций** на этом отрезке, если все функции попарно ортогональны.

$$\int_a^b \varphi_i(x)\varphi_j(x) dx = 0; \quad i \neq j$$

Отметим, что ортогональность функций не подразумевает перпендикулярности графиков этих функций.

Определение. Система функций называется **ортогональной и нормированной (ортонормированной)**, если

$$\int_a^b \varphi_i(x)\varphi_j(x) dx = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Определение. **Рядом Фурье по ортогональной системе функций** $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$ называется ряд вида:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \varphi_n(x)$$

коэффициенты которого определяются по формуле:

$$a_n = \frac{\int_a^b f(x)\varphi_n(x) dx}{\int_a^b \varphi_n(x)^2 dx},$$

где $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \varphi_n(x)$ - сумма равномерно сходящегося на отрезке $[a, b]$ ряда по ортогональной системе функций. $f(x)$ - любая функция, непрерывная или имеющая конечное число точек разрыва первого рода на отрезке $[a, b]$.

В случае ортонормированной системы функций коэффициенты определяются:

$$a_n = \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx$$

Интеграл Фурье.

Пусть функция $f(x)$ на каждом отрезке $[-l, l]$, где l - любое число, кусочно - гладкая или кусочно - монотонная, кроме того, $f(x)$ - абсолютно интегрируемая функция, т.е. сходится несобственный интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$$

Тогда функция $f(x)$ разлагается в ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{\pi n}{l} x + b_n \sin \frac{\pi n}{l} x \right)$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi n}{l} t dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{\pi n}{l} t dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

Если подставить коэффициенты в формулу для $f(x)$, получим:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi n}{l} t dt \cos \frac{\pi n}{l} x + \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{\pi n}{l} t dt \sin \frac{\pi n}{l} x \right) = \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi n}{l} (t-x) dt \end{aligned}$$

Переходя к пределу при $l \rightarrow \infty$, можно доказать, что $\lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt = 0$ и

$$f(x) = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi n}{l} (t-x) dt$$

Обозначим $u_n = \frac{\pi n}{l}$; $\Delta u_n = u_{n+1} - u_n = \frac{\pi}{l}$; $\frac{1}{l} = \frac{\Delta u_n}{\pi}$;

При $l \rightarrow \infty$ $\Delta u_n \rightarrow 0$.

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \Delta u_n \int_{-l}^l f(t) \cos u_n(t-x) dt$$

Можно доказать, что предел суммы, стоящий в правой части равенства равен интегралу

$$\int_0^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos u(t-x) dt$$

Тогда $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos u(t-x) dt$ - **двойной интеграл Фурье**.

Окончательно получаем:

$$f(x) = \int_0^{\infty} [a(u) \cos ux + b(u) \sin ux] du$$

$$a(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos ut dt$$

$$b(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin ut dt$$

- представление функции $f(x)$ **интегралом Фурье**.

Двойной интеграл Фурье для функции $f(x)$ можно представить в комплексной форме:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} du \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{iu(x-t)} dt$$

Преобразование Фурье.

Определение. Если $f(x)$ – любая абсолютно интегрируемая на всей числовой оси функция, непрерывная или имеющая конечное число точек разрыва первого рода на каждом отрезке, то функция

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-iux} dx$$

называется **преобразованием Фурье функции $f(x)$** .

Функция $F(u)$ называется также **спектральной характеристикой функции $f(x)$** .

Если $f(x)$ – функция, представимая интегралом Фурье, то можно записать:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{iux} du$$

Это равенство называется **обратным преобразованием Фурье**

Интегралы $F(u) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(x) \cos ux dx$ и $F(u) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(x) \sin ux dx$ называются соответственно **косинус - преобразование Фурье** и **синус – преобразование Фурье**.

Косинус – преобразование Фурье будет преобразованием Фурье для четных функций, синус – преобразование – для нечетных.

Преобразование Фурье применяется в функциональном анализе, гармоническом анализе, операционном исчислении, теории линейных систем и др.